


ANDROGENÉTICAS, alopecia que padecen el 85% de los hombres aproximadamente.

El concurso de una hormona (testosterona T), con una enzima (5alfa reductasa), da lugar a una hormona (DHT) muy perjudicial para el cabello que produce una inflamación en



las glándulas sebáceas y una miniaturización progresiva de los bulbos con atrofia en la papila en cada ciclo de crecimiento para acabar con la inevitable cicatrización de folículo pilífero impidiendo por completo toda regeneración capilar.

Existen patrones establecidos para la AGA, tanto en el hombre, que son cinco, como en la mujer, que son tres; estos patrones los estableció Hamilton en 1942 y aún hoy son válidos.



Patrón de AGA femenino

Patrón de AGA masculino

Las causas de esta alopecia se deben a factores genético-hereditarios, disfunciones hormonales, alteraciones del sistema nervioso, y sobre todo y como ya se dijo al principio: la acción de la DHT sobre los folículos pilosos receptores.

Tratamiento

la alopecia androgenética tiene un tratamiento variable en función de la evolución, su duración máxima es de diez meses repartidos en 4 fases.

Durante todo el tratamiento utilizaremos la mascarilla Dermocapilar (Ref. 28, 58) y los champúes Opar (Ref. 203) y Placent (Ref. 8) alternándolos y lavando diariamente por las mañanas.

1ª Fase.

Alpicar después de lavar Wontersil Fresh Cells (Ref. 115) diariamente durante 90 días.

2ª Fase.

Finalizados los 90 días dejar Wontersil Fresh Cells y aplicar Wontersil Science 6 (Ref. 40) 2 veces por día durante 60 días.

3ª Fase.

*Después de los 60 días con Wontersil Science 6, dejar y aplicar Wontersil Dixidox
(Ref. 105) ½ ampolla diaria durante 60 días.*

4ª Fase

Finalizaremos el tratamiento utilizando ADN+Polen (Ref. 66) 2 veces diarias durante 90 días consecutivos.